

# ভ্যাক্সিন গ্রহণ করুন

নিজেকে, নিজের পরিবারকে, এবং নিজের সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখুন



ভ্যাক্সিন প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচায়



## 1 বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের ভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে

গুরুতর অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার বাচ্চাকে ভ্যাক্সিন দিন।

8  
সপ্তাহ

6-ইন-1 (ডিপথেরিয়া, হেপাটাইটিস B, হিব, পোলিও, টিটেনাস, হোপিং কফ)  
রোটাইভাইরাস  
মেনিনজাইটিস B

12  
সপ্তাহ

6-ইন-1 (2nd ডোজ)  
নিউমোকোকাল(PCV)  
রোটাইভাইরাস(2nd ডোজ)

16  
সপ্তাহ

6-ইন-1 (3rd ডোজ)  
মেনিনজাইটিস B (2nd ডোজ)

## 1 থেকে 16 বছর বয়সী শিশুদের ভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে

স্কুলে প্রবেশের আগে শিশুদেরকে অবশ্যই তাদের প্রি-স্কুল বুস্টার গ্রহণ করতে হবে।  
প্রতিরোধযোগ্য রোগ থেকে আমাদের স্কুলকে সুরক্ষিত রাখুন।

1  
বছর

হিব/মেনিনজাইটিস C  
মিজলস, মাম্পস এবং রুবেলা (MMR)  
নিউমোকোকাল(PCV) (2nd ডোজ)  
মেনিনজাইটিস B (3rd ডোজ)

2-10  
বছর

ফ্লু (এছাড়া 6 মাস থেকে  
17 বছর বয়সী দীর্ঘস্থায়ী  
স্বাস্থ্যের সমস্যাবুক্ত শিশু)

3  
বছর  
+4 মাস

MMR (2nd ডোজ)  
4-ইন-1 প্রি-স্কুল বুস্টার (ডিপথেরিয়া, হোপিং কফ,  
টিটেনাস, এবং পোলিও)

12-13  
বছর

HPV  
হিউম্যান  
প্যাপিলোমাইভাইরাস)

14  
বছর

3-ইন-1 টিনেজ বুস্টার (টিটেনাস, ডিপথেরিয়া এবং পোলিও)  
মেনিনজোকোকাল A, C, W and Y

প্রাপ্তবয়স্কদেরকে ভ্যাক্সিন দেওয়া হচ্ছে  
আপনার ভ্যাক্সিন গ্রহণ করতে দেরি করবেন না

গর্ভবতী  
মহিলা

হোপিং কফ  
ফু

65+  
বছরের  
বেশি

ফু (65 বছরের বেশি বয়সীদের  
প্রত্যেক বছর দেওয়া হচ্ছে)

65  
বছরের  
বেশি

নিউমোকোকাল (PPV)

70-79  
বছর

শিংগলজ

আপনার যদি ডায়াবেটিসের  
মতো দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের সমস্যা  
থাকে, তাহলে আপনার জিপিকে  
জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি ফু বা  
নিউমোকোকাল ভ্যাকসিনের  
মতো অন্যান্য প্রতিরক্ষামূলক  
ভ্যাকসিন পেতে পারেন কিনা

ভ্যাক্সিন গ্রহণ  
নিস করেছেন?  
আপনার জিপি  
প্র্যাকটিসকে জিজ্ঞাসা  
করুন কিভাবে আপনি  
আপনার পরিবারের জন্য  
ভ্যাক্সিন নিতে পারবেন

ভ্যাক্সিনের জন্য বুক করতে আপনার জিপি সার্জারির সাথে যোগাযোগ করুন



বিভিন্ন ভাষায় টিকাদান সম্পর্কে তথ্যের জন্য  
আমাদের ওয়েবসাইটে যান এবং অনুবাদ  
আইকনে ক্লিক করুন

[www.coventry.gov.uk/health-wellbeing/immunisations](http://www.coventry.gov.uk/health-wellbeing/immunisations)

Bengali

