

# ویکسین کروائیں

اپنی، اپنی فیملی اور اپنی کمیونٹی  
کی حفاظت کریں

ویکسینز ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں جانیں بچاتی ہیں

1 سال سے کم عمر کے بچوں کو دی جانے والی ویکسین  
اپنے بچے کو سنگین بیماریوں سے بچانے کے لیے ٹیکے لگوائیں

8  
ہفتے

6-in-1 (خناق، ہیپاٹائٹس بی، انفلوئنزا، پولیو، تشنچ، کالی کھانسی)  
روٹا وائرس  
مینجائٹس بی

12  
ہفتے

6-in-1 (دوسری خوراک)  
نیومو کوکل (PCV)  
(دوسری خوراک) روٹا وائرس

16  
ہفتے

6-in-1 (تیسری خوراک)  
(دوسری خوراک) مینجائٹس بی

1 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو دی جانے والی ویکسین  
بچوں کو اسکول میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پری اسکول بوسٹر وصول کرنا چاہیے  
ہمارے سکولوں کو قابل علاج بیماریوں سے بچائیں

1  
سال

انفلوئنزا / مینجائٹس سی  
خسرہ، ممپس اور روپیلا (ایم ایم آر)  
(دوسری خوراک) نیومو کوکل  
(تیسری خوراک) مینجائٹس بی

2-1  
سال

فلو (اور 6 ماہ سے 17  
سال کی عمر والے بچے جن  
کے صحت کے دائمی  
مسائل ہوں)

3  
سال  
+4  
ماہ

(دوسری خوراک) ایم ایم آر  
ڈپتھیریا، کالی، پری اسکول بوسٹر 4-in-1  
(کھانسی، تشنچ، اور پولیو)

12-13  
سال

HPV  
(ہیومن  
ہیپیلوما وائرس)

14  
سال

ٹین ایج بوسٹر (ٹیٹنس، ڈپتھیریا اور پولیو) میننگوکوک اے، سی، 3-in-1  
ڈبلیو اور وائی

## بالغوں کو لگائی جانے والی ویکسین اپنی ویکسین میں تاخیر نہ کریں

حاملہ  
خواتین

کالی کھانسی  
فلو

65+  
سال  
سے زائد

فلو (65 سال سے زائد عمر والوں  
کو ہر سال آفر کی جاتی ہے۔

65  
سال  
سے زائد

(PPV) نیوموکوکل

70-79  
سال

خارش

اگر آپکو صحت کی کوئی دائمی  
بیماری لاحق ہے مثال کے طور پر  
ذیابیطس، تو اپنے جی پی سے  
پوچھیں کیا آپ حفاظتی ویکسین  
جیسا کہ فلو یا نیوموکوکل  
ویکسین لگوا سکتے ہیں

ویکسینیشن  
چھوٹ گئی؟

اپنی جی پی پریکٹس سے پوچھیں کہ  
آپ اپنی فیملی کی رہ جانوالی  
ویکسینیشن دوبارہ کیسے کروا  
سکتے ہیں

ویکسینیشن بک کروانے کے لیے اپنے جی پی سرجری سے رابطہ کریں۔



حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں معلومات کے لیے  
مختلف زبانوں میں ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور ترجمہ کرنے والے  
آئیکن پر کلک کریں۔

[www.coventry.gov.uk/immunisations](http://www.coventry.gov.uk/immunisations)

Urdu

