

آپ کے بچے کے ٹیکے کا شیڈول

12

ہفتے



- 1 میں 6 ٹیکے**
- نیوموکوکل کا ٹیکہ*
- روٹا وائرس کا ٹیکہ**

8

ہفتے



- 1 میں 6 ٹیکے*
- روٹا وائرس کا ٹیکہ*
- میننجانٹس بی کا ٹیکہ*

16

ہفتے



- 1 میں 6 ٹیکے***
- میننجانٹس بی کا ٹیکہ**

1


سال



- بيموفيلس انفلونزا ٹائپ بی / میننجانٹس سی کا ٹیکہ*
- میزلز، ممپس اور روبیلا کا ٹیکہ*
- نیوموکوکل کا ٹیکہ**
- میننجانٹس بی کا ٹیکہ***

3


سال اور
4 ماہ



- میزلز، ممپس اور روبیلا کا ٹیکہ**
- 1 میں 4 پری اسکول بوسٹر ٹیکہ

+2

سال



- بچوں کا فلو کا ٹیکہ (سالانہ)

* پہلی خوراک، ** دوسری خوراک، *** تیسری خوراک

1 میں 6 ذفتھیریا، ٹینٹس، کالی کھانسی، پولیو، بيموفيلس انفلونزا ٹائپ بی اور بیپائائٹس بی سے بچاتا ہے

1 میں 4 ذفتھیریا، ٹینٹس، کالی کھانسی اور پولیو سے بچاتا ہے

یہ ٹائم لائن ایک مفید
یاد دہانی کے بطور
اوپر چیکائیں

بیماریوں کے خلاف اپنے بچوں کا تحفظ کرنے
کے لیے ان کے ٹیکے کے شیڈول پر عمل کریں



- خسرے اور کالی کھانسی جیسی بچپن کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں
- یہ بیماریاں بچوں کو کافی بیمار بنا سکتی ہیں، جو ہسپتال میں بھرتی ہونے کا یا تاحیات مسائل کا باعث بنتی ہیں
- اگر آپ کے بچے کو ٹیکہ نہیں لگا ہے تو، وہ تحفظ یافتہ نہیں ہیں
- بہترین تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکے وقت پر لگائے جائیں۔ کچھ کو بعد میں بھی بوسٹر خوراکیوں کی ضرورت پڑتی ہے
- اپنے بچے کا ذاتی بچے کی صحت کا ریکارڈ (لال کتاب) چیک کریں یا اپنے جنرل پریکٹیشنر (GP) کی پریکٹس سے بات کر کے پتہ کریں کہ آیا ان کا کوئی ٹیکہ چھوٹ گیا ہے
- آپ اب بھی بیشتر چھوٹے ہوئے ٹیکوں کو لگوا سکتے ہیں
- بچپن کی سبھی ٹیکہ کاریاں مفت ہیں۔ بچوں کی عمر بڑھنے پر، انہیں ٹیکہ کی مزید اپائنٹمنٹس، براہ راست تب تک پیش کی جائیں گی جب تک وہ ٹین ایجر نہ ہو جائیں۔ کچھ ٹیکے اسکول میں پیش کیے جاتے ہیں
- NHS کی طرف سے پیش کردہ ٹیکہ کاریوں کی پوری طرح سے جانچ کر کے یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ وہ کس قدر محفوظ اور مؤثر ہیں۔ ساری دوائیں ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن ٹیکے بہت ہی محفوظ ترین میں سے ہیں۔
- دنیا بھر میں ہونے والی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مامونیت ہمارے بچوں کی صحت کا تحفظ کرنے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے

کیا آپ کے بچے کے ٹیکے اپ ٹو ڈیٹ ہیں؟
ان کے جنرل پریکٹیشنر کی پریکٹس میں ابھی بک کریں